


ОСПА ОВЕЦ И КОЗ: чем опасна и как предупредить



Источник инфекции:

- больные животные, которые рассеивают вирус в окружающую среду с подсыхающими и отторгающимися оспенными корками и слущивающимся эпителием;
- вирус, выделяемый со слизью из носа, который передается здоровым овцам аэрогенным путем;
- попадание вируса на слизистую оболочку ротовой полости.

Факторами передачи возбудителя являются корма, навоз, предметы ухода, загрязненные выделениями больных животных. Переносчиками возбудителя могут быть животные других видов и люди.

Симптомы и течение болезния: инкубационный период 3-14 дней. Болезнь начинается угнетением, анорексией, лихорадкой (повышение температуры до 41-42°). Появляются отеки кожи век, гнойное истечение из носа и глаз. Дыхание затрудненное, пульс учащенный. Оспенная сыпь появляется на голове, губах, крыльях носа, щеках, вокруг глаз, внутренней поверхности тазовых конечностей.

Меры по предупреждению возникновения оспы и недопущению ее распространения:

- поставить на учет в ветеринарной службе и органах местного самоуправления всех животных имеющихся в животноводческих и личных подсобных хозяйствах;
- извещать государственную ветеринарную службу о вновь приобретённых животных, полученном приплоде, об убое и продаже, о случаях внезапного падежа или одновременного заболевания нескольких животных;
- не допускать ввода (ввоза) на территорию хозяйства овец, коз, а также кормов и инвентаря из неблагополучных по оспе овец и оспе коз хозяйств;
- не допускать ввоз животных неизвестного происхождения (без ветеринарных сопроводительных документов);
- проводить в течение 30 дней карантинирование вновь поступивших в хозяйство животных;
- проводить ежедневный клинический осмотр животных, обращая внимание на общее состояние появление отдельных симптомов заболевания;
- содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии пастбища, места водопоя, животноводческие помещения.

